

privind Vaccinarea tip ARNm COVID-19 a femeii gravide sau care alăptează

Având în vedere:

- prevederile art. 1 alin. (3) din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, numit în continuare Comitet,

- Decizia prim-ministrului nr. 386/2020 pentru desemnarea domnului Valeriu Gheorghiță, șef al Centrului Medical de Intervenție Epidemiologică la spitalul Universitar de Urgență Militar "Dr. Carol Davila", în calitate de președinte al Comitetului,

- Regulamentul propriu de organizare și funcționare a Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, aprobat prin decizia președintelui Comitetului,

Președintele Comitetului emite prezenta

INSTRUCȚIUNE

Art.1 Vaccinarea anti-COVID – 19 a femeilor gravide/care alăptează trebuie luată în considerare atunci când beneficiile potențiale depășesc orice riscuri potențiale pentru mamă și făt.

Art.2 Gravidele reprezintă o populație cu risc înalt, alături de pacienții cu cancer, obezitate, diabet, boli renale, cardiace, fibroză chistică, imunosupresie etc, toți dezvoltând forme severe de Covid-19; în plus, gravida poate avea oricare dintre aceste comorbidități.

Art.3 Femeile gravide sau care alăptează trebuie să fie corect informate privind următoarele aspecte:

- gradul de expunere al gravidei la locul de muncă/la domiciliu
- îmbolnăvirea gravidei poate pune la risc membrii familiei (mai ales dacă aceștia au comorbidități)
- riscurile mamei și fătului în momentul îmbolnăvirii cu Covid-19 (severitatea bolii)
- eficiența vaccinului ARNm Covid-19
- frecvența și intensitatea reacțiilor adverse sunt aceleași ca în populația generală
- datele limitate de siguranță ale vaccinului (nu a fost testat pe gravide)

Art. 4 Prin prezenta Instrucțiune se aproba informațiile* din ANEXA

PREȘEDINTE

Colonel Șef de Încări

Dr. Valeriu GHEORGHIȚĂ



Vaccinarea tip ARNm COVID-19 a femeii gravide sau care alăptează

PREȘEDINTE
Colonel Șef de lucrări

Dr. Valeriu CHEORGHITĂ



Coordonator grup de lucru,

Dr. Adriana PISTOL



Elaborat de:
Dr. Aurora STĂNESCU



ANEXA

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) – 21 Decembrie 2020

- Nu există date că vaccinurile Covid-19 sunt contraindicate în sarcină. Gravidele trebuie să fie libere să decidă dacă se vaccinează sau nu
- Nu este necesară amânarea obținerii sarcinii după terminarea vaccinării cu ambele doze de vaccin
- Prin mecanismul lor de acțiune, se consideră că vaccinurile nu cresc riscul de infertilitate
- Dacă o femeie rămâne gravidă după prima doză, a 2-a doză trebuie administrată conform protocolului
- Testul de sarcină nu este necesar înainte de administrarea vaccinului
- Vaccinul gripal și vaccinul dTpa trebuie făcute în sarcină la interval de minim 14 zile de la administrarea vaccinului Covid-19
- Imunoglobulina anti-D nu interferează cu răspunsul imun al vaccinului și trebuie făcută în continuare conform protocolului

Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) - 14 Decembrie 2020

- Femeile care alăptează nu au fost incluse în studiile clinice, dar datele sugerează că vaccinul nu trece în lapte și în orice caz nu poate acționa asupra nou-născutului. Dacă vaccinul Covid-19 este înghițit și nu injectat intramuscular, este supus digestiei și inactivat imediat
- O gravidă vaccinată Covid-19 în sarcină este foarte probabil să transmită anticorpi nou-născutului prin lapte și să îi ofere astfel acestuia o anumită imunitate, imunitate ce va fi crescută ulterior prin continuarea alăptării

Joint Committee on Vaccination and Immunisation (RCOG - JCVI) - 30 Decembrie 2020

- Ca măsură de prevedere, nu este încă recomandată de rutină vaccinarea la gravide, din cauza lipsei de date. Cu toate acestea, este recomandat gravidelor clinic vulnerabile să discute opțiunea vaccinării cu medicul lor, deoarece comorbiditățile acestora le conferă un risc foarte crescut de a dezvolta complicații grave ale bolii Covid-19. De asemenea, gravidele care lucrează în sistemul medical sau de îngrijire socială trebuie să discute opțiunea vaccinării
- Nu există nici un risc cunoscut al vaccinării Covid-19 pentru femeile care alăptează
- Aceste recomandări se bazează pe situația de moment, până când datele clinice vor permite ca vaccinarea să fie recomandată de rutină tuturor gravidelor

**Date furnizate de Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România.*